



A NŐI EGÉSZSÉGÉRT!

A MENOPAUZA UTÁN
FELLÉPŐ TÜNETEK ENYHÍTÉSÉRE



AZ INTIM EGYENSÚLYÉRT
VAGILACT-Q



Helene S
A BIZTONSÁGOS
FOGAMZÁSGÁTLÁS



1053 Budapest Veres Pálné utca 4-6.
Telefon: 06-1-275-89-65
www.qpharma.hu | info@qpharma.hu



MAGYAR NŐORVOS TÁRSASÁG III. SZAKMAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAMA

2013. május 31. - június 1., Hotel Azúr, Siófok



Programfüzet



A mi sikerünk az Ön elégedett páciense.



Higgyen a saját tapasztalatának!

Kedves Kolléganők és Kollégák!

Az elmúlt két évben lezajlott tanfolyamok sikerét tapasztalva, a Magyar Nőorvos Társaság 2013. május 31. és június 1. között megtartja III. Továbbképző Kurzusát, mely az MNT Kongresszusok közötti években kerül immár hagyományosan megrendezésre.

A témaköröket a szakma vezető szakteknitélyei foglalják össze, a Tanfolyam kreditpontos vizsgával zárul (50 kreditpont). A visszajelzések alapján, az elmúlt évekhez hasonlóan sok résztvevőre számíthatunk, reményeink szerint ezúttal is magas színvonalú, érdekes tudományos programot tudunk nyújtani.

Az évenkénti találkozással a szakmai továbbképzésen túl, jó lehetőség adódik a szülészeti-nőgyógyászati aktuális kérdéseinek megbeszélésére, a kollégákkal történő találkozásra. A Szervező Bizottság bízik abban, hogy a kora nyári Balaton-part ismét tökéletes helyszínt biztosít a tanfolyam megrendezéséhez.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt, kellemes és hasznos időtöltést kívánva a résztvevőknek.

Prof. Dr. Bódis József
az MNT elnöke

Dr. Ács Nándor
a Szervező Bizottság vezetője



A kombinált orális fogamzásgátlás több mint fél évszázada után íme a Zoely®...

A Zoely alacsony dózísú hormonok egyedi és hatékony kombinációja^{2,3}

Az aktív tabletták a következő kombinációt tartalmazzák:

- nomegestrol-acetátot, mely erősen szelektív progesztogén hatású progeszteron származék²
- 17β-ösztadiolt, ami szerkezetét tekintve azonos az endogén ösztrogénnel²

A Zoely progesztogén összetevőjének 46 óra az eliminációs felezési ideje²

A Zoely bizonyítottan hatásos²

- Hatásossága >99%²
- Optimalizált, 24/4 adagolási séma^{2,3}

A Zoely rövid ideig tartó, kevésbé intenzív havi vérzést biztosít^{2,4}

Zoely filmtabletta: 2,5 mg nomegestrol-acetát és 1,5 mg ösztadiol (fehér tabletták), placebo (sárga tabletták) Kizárólag orvosi rendelvényhez köthő gyógyszer (V) **Javallatok:** orális fogamzásgátlás. **Adagolás és alkalmazás:** 24 egymást követő napon keresztül naponta 1 fehér tablettát, majd 4 napon keresztül naponta 1 sárga tablettát, minden nap nagyjából ugyanabban az időpontban kell bevenni. Szedését a menstruációs ciklus 1. napján kell elkezdeni. Ennek részleteiről, valamint a kimaradt tabletták, ill. hányós, hasmenés, más gyógyszereszedés esetén követendő tennivalókról feltétlenül tájékozódjon a részletes alkalmazási előírásból. **Ellenjavallatok:** Mivel a 17β-ösztadiol tartalmú kombinált orális fogamzásgátlókra (COC) vonatkozóan még nem állnak rendelkezésre epidemiológiai adatok, ezért az etinilösztadiol tartalmú kombinált orális fogamzásgátlókra (COC) vonatkozó ellenjavallatokat a Zoely alkalmazására is érvényesnek tartják. Hatányanyag/segédanyaggal szembeni túlérzékenység, aktív vagy korábbi vénás vagy artériás tromboembóliás betegség, trombozisos kórtörténetre figyelmeztető tünetek a körélményben, trombozisos hajlamú állapotok, jelentős, vagy többszörös rizikófaktorok, örökletes vagy szerzett hajlam, meglévő, vagy körélményben szereplő cerebrovaszkuláris törzések, fokális neurológiai tünetekkel kísért migrén az anamnézisben, aktív vagy korábbi pancreatitis (súlyos hipertrigliceridémia), aktív, vagy korábbi súlyos májbetegség (fennálló májfunkciós zavarokkal), aktív vagy korábbi májdaganat, a nem szervek, vagy az emlő kórosított vagy feltételezett, szteroid-dependens rosszindulatú daganatai, tisztázatlan eredetű hüvelyi vérzés, terhesség. **Figyelmeztetések:** Abban az esetben, ha bármelyik fennléni a következőkben felsorolt állapotok/rizikófaktorok közül, gondosan mérlegelni kell a COC alkalmazásának várható előnyeit és lehetséges veszélyeit, és ezeket az érintett felhasználóval is meg kell beszélni. Artériás és vénás thrombosis, ill. thromboembóliás betegségek, vénás, vagy artériás thromboembóliára való örökletes, vagy szerzett hajlamot tükröző biokémiai elváltozások. A kombinált orális fogamzásgátlókat (COC) alkalmazó nők figyelmét különösképpen fel kell hívni arra, hogy a thrombosis lehetséges tünetei esetén forduljanak orvoshoz. Thrombosis gyanúja vagy igazolt thrombosis esetén a kombinált orális fogamzásgátló (COC) alkalmazását abba kell hagyni. Daganatok: a méhnyakrák fokozott kockázatot állapították meg hosszú ideje COC készítményeket szedőkön. Egyéb állapotok: életkor növekedése, dohányzás, dyslipoproteinémia, obesitas, hipertónia, migrén, cukorbetegség. **Interakciók:** Az orális fogamzásgátlók és az enziminduktor gyógyszerek közötti kölcsönhatások átfordíthatóak, ezért a fogamzásgátló hatás elmaradásához is vezethetnek. A méhnyakrák hatóanyagokkal végtelen hosszantartó kezelés esetén más fogamzásgátló módszer alkalmazását kell mérlegelni. Az orális fogamzásgátlók befolyásolhatják más gyógyszerek metabolizmusát. Különös figyelmet kell szentelni a lamotriginnel való kölcsönhatásnak. **Terhesség:** Zoely ellenjavallt terhesség alatt. Ha a Zoely szedése alatt terhesség alakul ki, a gyógyszer további szedését abba kell hagyni. **Szoptatás:** A kombinált orális fogamzásgátlók (COC) alkalmazása addig nem javasolt, amíg a szoptató anyajeljesen el nem választotta gyermekét. **Különleges populációk:** Nincs rendelkezésre álló adat a hatásosságra és a biztonságosságra vonatkozólag 18 év alatti serdülők esetében. **Nemkívánatos hatások:** >10%: acné és rendellenes megvonásos vérzés; >1%: csökkent libido, depressziós hangulat, fejfájás, migraine, hányinger, meltrorrhagia, testhőmérsékletnövekedés, emlőfájdalom és kismencedel fájdalom. **Felírás előtt, kérjük, olvassa el a teljes alkalmazási előírást, különös tekintettel a pontos indikációkra (4.1), az adagolásra és alkalmazásra (4.2) és a figyelmeztetésekre (4.4)** (EMA/2012.04.20)

Referenciák: 1. Dhont M. History of oral contraception. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2010;15(2):S12-S18. 2. Zoely alkalmazási előírás. 3. Christin-Maitre S, Serfaty D, Chabbert-Buffet N, Ochszenben E, Chassard D, Thomas J-L. Comparison of a 24-day and a 21-day pill regimen for the novel combined oral contraceptive, nomegestrol acetate and 17β-estradiol (NOMAC/E2): a double-blind, randomized study. Hum Reprod. 2011;26(6):1338-1347. 4. Mansour D, Verhoeven C, Sommer W, Weisberg E, Taneepanichskul S, Mellis GB, Sundström-Poromaa I, Korver T. Efficacy and tolerability of a monophasic combined oral contraceptive containing nomegestrol acetate and 17β-estradiol in a 24/4 regimen, in comparison to an oral contraceptive containing ethinylestradiol and drospirenone in a 21/7 regimen. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2011 Dec;16(6):430-43. A dokumentum lezárásának ideje: 2012. augusztus 28.

08-2013-WOMIN-10497-0004

MSD Pharma Hungary Kft. 1095 Budapest, Lechner Ó. fasor 8. Tel.: 888-5300 Fax: 888-5388



A tanfolyam kiemelt támogatói:



150 Years
Science For A Better Life



Főtámogató:



Támogatók:



MATERNITY MAGÁNKLINIKA

Kiállítók:



Gyno-Cont Kft.



RICHTER GEDEON



Egészség. Ön dönt.



Európa vezető ősejtbankja



Elérhetőségek

Címünk: 1125 Budapest, Kútvelyi út 4.
Ambuláns előjegyzés: 06-1-2134222
Fekvőbeteg osztály: 06-1-2134220
e-mail: info@maternity.hu



A HELY, AHOL CSALÁD SZÜLETIK

A gyermekáldás minden párkapcsolatban az egyik legnagyobb várakozással járó esemény. A várandósság egy életre szóló csoda kezdete, amikor több hónap várakozás után gyermekünk születésével a kapcsolatunk párunkkal igazán teljessé válik.

A SZÜLÉSI CSOMAG HÉT APRÓ FIGYELMESSÉGET TARTALMAZ:

1. „család születik”: elhelyezés családi szobákban
2. a szolgáltatás a 38. héttől kezdődik (ingyenes CTG, UH – és nőgyógyászati vizsgálat)
3. édesapa a szülésnél és a császármetszésnél is jelen lehet
4. azonos a szülés és császármetszés ára
5. az ár tartalmazza a szülési fájdalomcsillapítás (EDA) és a császármetszés érzéstelenítését
6. neonatológus orvos jelenléte
7. két éjszaka teljes ellátása a szülés után

AMBULÁNS VIZSGÁLATOK

- Nőgyógyászat
- Várandós nők gondozása
- Aneszteziológiai ambulancia
- Dietetikai tanácsadás
- Fogamzás előtti egészségtanácsadás
- Genetikai tanácsadás
- Gyermekegyógyászat
- HPV-ambulancia
- Menopauza-tanácsadás
- Pszichológia és pszichiátria
- Tinédzser ambulancia
- Újszülött- és csecsemőgyógyászat

SPECIÁLIS VIZSGÁLATOK

- Genetikai vizsgálatok terhesség alatt
- HyCoSy vizsgálat
- Csecsemő-ultrahang (agy, has, csípő)
- Cukorbeteg várandós nők gondozása
- Endokrinológia
- Gondozási program a koraszülés megelőzésére arra hajlamos terhesek részére
- Inkontinencia diagnosztika, terápia
- Magzati és újszülött echocardiographia, csecsemőkardiológia
- PCO (policisztás ovárium szindróma) tanácsadás
- Súlyos betegségben (pl. HELLP szindrómában) szenvedő várandós nők gondozása

2013. május 31., péntek

9.30 - 9.45 Magyar Nőorvos Társaság – megnyitó

Prof. Dr. Bódis József, elnök

9.45 - 11.15 Előadások

Üléselnök: Dr. Ács Nándor

A komplett medencefenék rekonstrukció implantációs technikával

Dr. Endrődi Tamás
Toldy Ferenc Kórház, Cegléd

A szüléset-nőgyógyászat aktuális jogi kérdései 2013-ban

Dr. Sztakó Péter
Uzsoki Utcai Kórház, Budapest

Az alsó húgyutakat érintő mélyen infiltráló endometriózis sebészeti kezelése

Dr. Bokor Attila
SE I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

A szüléset-nőgyógyászati aneszteziológia aktuális kérdései

Dr. Hupuczi Petronella
SE Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Maternity Szülészeti és Nőgyógyászati Magánklinika, Budapest

A magzati kromoszóma rendellenességek korszerű molekuláris biológiai szűrése és diagnosztikája

Dr. Lázár Levente
SE I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

New Era Genetics előadás

A PrenaTest® helye az európai prenatalis diagnosztikában

Dr. Michael Lutz, vezérigazgató
Lifecodexx AG, Konstanz, Németország

11.15-11.30 Szünet

11.30-13.00 Előadások

Üléselnök: Prof. Dr. Tóth Zoltán

Merck Kft. előadás – Folsav vagy folát?

Prof. Dr. Bánhidny Ferenc
SE II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

A császármetszés gyakoriságának alakulása

Prof. Dr. Tóth Zoltán
DEOEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Debrecen

A pszichológiai szűrés bevezetése a szegedi terhesgondozásba: 2 év tapasztalatai és statisztikája

Dr. Tőreki Annamária
SZTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Szeged

Nőgyógyászati daganatok műtéti kezelése

Prof. Dr. Póka Róbert
DEOEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Debrecen

A mélyen infiltráló endometriózis diagnosztikájának buktatói

Dr. Koppán Miklós
PTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Pécs

A nemzetközi szülészeti tanulmányok jelentősége a mindennapi gyakorlatban

Dr. Major Tamás
DEOEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Debrecen

13.00-14.00 Ebéd

14.00-15.00 MSD Szimpózium - „Praxis határok nélkül”

Üléselnök: Dr. Ács Nándor

Igazságügyi orvosszakértés a szüléset-nőgyógyászatban

Dr. Tóth Zsuzsanna
igazságügyi orvosszakértő, Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézet

Az orvosok büntetőjogi felelőssége a bírói gyakorlat tükrében

Dr. Nagy Erzsébet
Szegedi Ítéltábla büntető ügyszakos bírójája

Hibák és tévedések kommunikációja az orvosi gyakorlatban

Dr. Pilling János
pszichiáter, kommunikációs szakember, SE Magatartástudományi Intézet

15.00-15.30 Előadások

Üléseknök: Dr. Demeter János

A kismencedei sülljedések UH diagnosztikája

Dr. Sipos Attila

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa

A méhnyak vizsgálatának jelentősége terhesség alatt

Dr. Vizer Miklós

PTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Pécs

15.30-15.45 Szünet

15.45-17.30 Előadások

Üléseknök: Prof. Dr. Rigó János

Az anyai halálozás trendjei hazánkban

Prof. Dr. Rigó János

SE I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

Peripartalis cardiomyopathia

Dr. Masszi Gabriella

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, Budapest

Minimal invazív suburethralis sling (mini sling) műtétek a női stressz incontinencia kezelésében

Dr. Rubliczky Levente

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház, Székesfehérvár

Hysterectomia - változó indikációk és elvek

Dr. Pap Károly

Jósa András Oktatókórház, Nyíregyháza

A non-invazív prenatalis diagnosztika jelene és jövője

Dr. Török Olga

DEOEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Debrecen

A menopausa hatása a központi idegrendszerre

Dr. Pál Zoltán

SZTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Szeged

18.00 A Magyar Nőorvos Társaság küldöttgyűlése

Marbella terem

20.00 Közös vacsora

Európa vezető
magzatvédő vitaminja*



femibion®
A szakértők ajánlásával



MCFE111/130429

*IMS Data MAT 12/2012, Europe

Merck Kft. – Consumer Health Care • 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 6-10. • Tel.: (1) 463-8100 • Fax: (1) 463-8174

MERCK

2013. június 1., szombat

9.00-10.30 Előadások

Üléselnök: Prof. Dr. Paulin Ferenc

A szexuális élet változása terhesség alatt

Dr. Mészáros Gyula

SZTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Szeged

Postpartum vérzés: Új transfúziós protokoll

Prof. Dr. Rákóczi István

Szent Imre Kórház, Szülészeti-Nőgyógyászati Profil, Budapest

Visszatérő hüvelyi fertőzések immunológiai alapú kezelése

Dr. Vajda György

Zalaegerszegi Megyei Kórház, Zalaegerszeg

A korai petefészkek-kimerülés klinikuma és diagnosztikája

Dr. Beke Artúr

SE I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

Az urogenitális traktus prolapsusának műtéti megoldása

Dr. Fekete Zoltán

SZTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Szeged

A reprodukciót befolyásoló bakteriális STD fertőzések jelentősége és diagnosztikája

Prof. Dr. Rozgonyi Ferenc

SE Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika

10.30-11.00 Szünet

11.00-11.30 Bayer szimpózium

Az erős menstruációs vérzés korszerű kezelése

Prof. Dr. Szöllősi János

SZTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Szeged

Mozi - Bepillantás a fogamzásgátlás jövőjébe (OC 2.0)

11.30-12.30 Előadások

Üléselnök: Prof. Dr. Pajor Attila

A diabeteses várandósok ellátása a terhesség és szülés alatt

Prof. Dr. Szilágyi András

Kaposi Mór Oktatókórház, Kaposvár

Reumatológiai betegségekben szenvedő nők reprodukciója

Dr. Veszprémi Béla

PTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Pécs

A szüléset helyzete hazánkban a szülészeti adatszolgáltatás, a "Tauffer", adatai alapján

Dr. Csákány M. György

Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház, Budapest

A STAN alkalmazása a szülésvezetésben

Dr. Halvax László

PTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Pécs

12.35- Tesztvizsga

13.00-14.00 Ebéd

Vitamin D₃ Fresenius® 1000 NE tableta

A Vitamin D₃ Fresenius 1000 NE tableta

- ♥ Az GYEMSZI-OGYI által engedélyezett **gyógyszer**.
- ♥ 1000 NE kolekalciferolt tartalmazó tableta.
- ♥ Pontosan, az ajánlásoknak megfelelően adagolható.
- ♥ A betegek számára kényelmes és megbízható terápia.

Ára rendkívül kedvező:

Napi kezelési költség, adagolástól függően: **4 – 9 Ft.**

	Bruttó fogyasztói ár	Normatív támogatás 55% , a beteg térítési díja	Indikációhoz* kötött támogatás 70% , a beteg térítési díja
Vitamin D₃ Fresenius 1000 NE tableta 30x	570 Ft	256 Ft	171 Ft
Vitamin D₃ Fresenius 1000 NE tableta 90x	728 Ft	328 Ft	218 Ft

*Eü. 70%-os támogatási kategória. Eü. 9.a pont. OEP honlap: 2013. 05.01.

Rövidített alkalmazási előírás.

Felírás előtt kérjük olvassa el a teljes alkalmazási előírást!

Minőségi és mennyiségi összetétel: 1000 NE kolekalciferol (Vitamin D₃) tablettánként. **Terápiás javallatok:** D-vitamin hiányos állapotok megelőzése és kezelése. Osteomalacia felnőttekben, időskori osteomalaciával együttjáró osteoporosis adjuváns kezelése. **Ellenjavallatok:** D₃ vitaminnal, ill. a készítmény más komponenseivel szembeni túlérzékenység. Hypercalcaemia és/vagy hypercalcuria, D hypervitaminózis.

Forgalombahozatali engedély száma: OGYI-T-2088/01 (30x), OGYI-T-2088/02 (90x).

OEP honlap: 2013.04.01. **Lezárva:** 2013. 05. 02.

D_ FK_2013_05 Medi-Draw

FRESENIUS KABI Hungary Kft.

1036 Budapest, Lajos u. 48-66.
Tel: 06 1 250 8371, Fax: 06 1 250 8372;
E-mail: info@fresenius-kabi.hu
Rendelésfelvétel: 06 1 250 8350



**FRESENIUS
KABI**

Óvjuk az életét

HOGY A HPV VAKVINÁCIÓ ANYAGI MEGFONTOLÁSOK
HELYETT SZAKMAI ALAPON TÖRTÉNHESSEN!

SILGARD®: A MÉHNYAKRÁK VAKCINA ÉS MÉG TÖBB...

2013. március 18-tól június 18-ig
15.900 Ft-ért* oltásonként
A PATIKÁKBAN

*Ajánlott fogyasztói ár

- A Magyarországon forgalomban lévő két HPV vakcinával megelőzhető méhnyakrások esetek száma 100.000 vakcinált nőre vonatkoztatva közel azonos.^{2, 3}
- A méhnyakrák mellett a szeméremtesti és hüvelyrák, valamint a nemi szervi szemölcsök megelőzésére azonban CSAK A SILGARD VAKVINÁVAL VAN LEHETŐSÉG!^{4, 5}

A döntés az Ön kezében van: csak **Ön adhat esélyt** a pácienseinek, hogy egy vakcinával **NE CSAK** a méhnyakrákot előzzék meg!⁴

„...az egyéni HPV prevenció felelőssége a kezelőorvosé: neki kell eldönteni a rendelkezésére álló, esetenként nem egyértelmű információk alapján, hogy melyik vakcinát ajánlja a páciensének”

A 2012-ben HPV vakcinációban részesült páciensek több mint 2/3-ának a SILGARD vakcinát javasolta a kezelőorvosa.⁶

A felhasznált irodalom jegyzéke: 1. Mészáros Gy. Nőgyógyászati és Szülészeti Továbbképző Szemle 2012.február:1-2. 2. Munoz N et al. J Natl Cancer Inst. 2010;102:325-339. 3. Lehtinen M et al. Lancet Oncol. 2012;13:89-99. 4. Silgard alkalmazási előírás: http://ec.europa.eu/health/documents/communityregister/2011/20111219114949/anx_114949_hu.pdf 5. Cervarix alkalmazási előírás: http://ec.europa.eu/health/documents/communityregister/2011/20111205114269/anx_114269_hu.pdf 6. Az IMS (International Medical Statistics) forgalmi adatai – Magyarország, 2012. január–december

A Silgard (humán papillómavírus [HPV] vakcina [rekombináns, adszorbeált], MSD) 6, 11, 16 és 18-as típusú HPV rekombináns L1 fehérjét tartalmaz (összesen 20, 40, 40, ill. 20 µg 0,5 ml-ben. AAHS adjuvánsra adszorbeálva). A szuszpenziós injekció csak vénre adható. **Javallatok:** 9 éves kortól a HPV bizonyos onkológiai típusai által okozott premalignus genitális lesiók (cervicális, vulváris és vaginales), méhnyakrák, valamint specifikus HPV-típusok által okozott külső genitális szemölcsök (condyloma acuminatum) megelőzésére szolgál. **Adagolás:** 0,5 ml-es adag 3 alkalommal, a 0., 2. és 6. hónapban. beadva (váll- vagy combizomba). Alternatívánként: 0., 1. és 4. hónapban vagy tetszőlegesen nagyobb időközökkel, de mindhárom dózist 1 éven belül. Az emlékeztető oltás szükségességét még nem állapították meg. **Ellenjavallatok:** bármely összetevő iránti túlérzékenység (ha erre utaló tünetek léptek fel az egyik dózis után, a további dózistok nem szabad beadni); akut, magas lázzal járó megbetegedés (ilyenkor az oltást el kell halasztani); kisebb fertőzések esetén azonban nem kontraindikált). **Figyelmeztetések:** Az egyes személyek oltásával kapcsolatos döntés során figyelembe kell venni egy előzetes HPV-érzékenység kockázatát, valamint az oltás által nyújtott potenciális előnyt. Mint minden injektható vakcina esetében, megfelelő orvosi ellátásnak mindig rendelkezésre kell állnia a vakcina beadását követően, ritka esetben fellépő anafilaxiás reakciók kezelésére. Bármely vakcina beadását követően ájulás következhet be, főként serdülőknél és fiatal felnőtteknél. Silgard-dal történt vakcináció után előfordult már ájulás, mely időnként összeeséssel és/vagy tonusos-klonusos mozgásokkal járt együtt. Ennél fogva a beoltott személyeket a Silgard-dal történt vakcinációt követően kb. 15 percig gondos megfigyelés alatt kell tartani. Más oltásokhoz hasonlóan nem feltétlenül eredményez védettséget minden egyes beoltott. **Gyógyszerkölcsönhatások:** A Silgard együtt adható olyan kombinált emlékeztető oltással, amely diphtériát és tetanuszt tartalmaz pertussisszal és/vagy poliomyelitissel (IPV) együtt vagy anélkül, hogy az bármely vakcina, bármely komponensére adott immunválaszra szignifikáns hatást gyakorolna. **Terhesség:** Nem végeztek a vakcinával specifikus vizsgálatokat terhes nőknél. A klinikai fejlesztési program során 3819 nő (1894 oltott és 1925 placebo kapó) jelentett legalább egy terhességet. A rendelkezésre álló adatok alapján a mellékhatással kísért terhességék aránya terhes nőknél nem volt szignifikánsan eltérő a placebo kapó személyek csoportja között. Ezek, a terhes nőknél nyert adatok (több mint 1000 expozíció eredményei) nem jeleznek malformatív vagy feto-neonatalis toxicitást. A terhesség ideje alatt beadott Silgard esetében semmilyen aritmiasági jelzés nem mutatkozott. Azonban ezek az adatok nem elegendőek ahhoz, hogy a Silgard alkalmazása terhességben is javasolt legyen. Az oltást a terhesség végéig el kell halasztani. **Szoptatás:** A Silgard szoptatás alatt alkalmazható. **Főbb mellékhatások:** A leggyakrabban megfigyelt mellékhatások az injekció beadásának helyén fellépő mellékhatások (a beoltottak 77,1%-ánál, bármelyik vakcináció után 5 napon belül léptek fel) és a fejfájás voltak (a beoltottak 16,6%-ánál lépett fel). Ezek a mellékhatások általában enyhe-közepes intenzitásúak voltak. **Különleges populáció:** Nem áll rendelkezésre adat a Silgard alkalmazásáról károsodott immunrendszerű betegek esetén. Erős immunosuppresszív kezelés, genetikai hiba, humán immundeficiencia vírus (HIV) fertőzés, vagy egyéb okból kifolyólag károsodott immunrendszerű betegeknek előfordulhat, hogy nem reagálnak a vakcinára. A rendszeres cervicális méhnyakrákszűrés továbbra is rendkívül fontos. **Felíráse előtt kérjük, olvassa el a teljes alkalmazási előírást, különösképp a pontos indikációkra (4.1), az adagolásra és alkalmazásra (4.2), a figyelmeztetésekre (4.4).** (EMA/H/C/732/WS/241/2012.05.25.)



MSD Pharma Hungary Kft.

1095 Budapest, Lechner Odón fasor 8., Millennium Tower III., 3. emelet • Telefon: 888 5300 e-mail: hungary_msd@merck.com
Minden jog fenntartva. A dokumentum lezárásának dátuma: 2013. február 19., VACC-1073031-0000



SILGARD®
Humán papillómavírus vakcina
[6-os, 11-es, 16-os, 18-as típusú]
(rekombináns, adszorbeált)

Általános információ

A tanfolyam helyszíne

Hotel Azúr, Siófok - 8600 Siófok, Erkel Ferenc utca 2/C.

A tanfolyam honlapja

www.congressline.hu/mnt2013

A Szervező Bizottság vezetője

Dr. Ács Nándor

Semmelweis Egyetem, II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

1082 Budapest, Üllői út 78/a

Tel: (1) 459-1500/53112

E-mail: acs.nandor@med.semmelweis-univ.hu

Szervező Iroda

CongressLine Kft.

Papp-Vid Melinda (kiállítás, szponzoráció)

E-mail: pappvid@congressline.hu

Gaitz Éva (regisztráció, szállásfoglalás)

E-mail: gaitz@congressline.hu

1065 Budapest, Révay köz 2.

Tel: (1) 429 0146; (1) 312 1582 Fax: (1) 429 0147

www.congressline.hu

A Regisztrációs Iroda nyitva tartása a tanfolyam ideje alatt

2013. május 31., péntek 08:00 – 18:00

2013. június 1., szombat 08:00 – 13:00

Kreditpont

A tanfolyam akkreditálásra került, szombaton tesztvizsgával zárul, a résztvevők 50 kreditpontot szerezhhetnek.

Internet

Az Azúr Hotelben Wi-Fi Internet hozzáférés biztosított, amely a lobby területén ingyenes, a szobákban 3.990 Ft/nap.

Ebéd

A tanfolyam ebédszünetében ebédet biztosítunk május 31-én és június 1-jén.

Busztranszfer

A tanfolyam ideje alatt (május 31-én 14.00 órától a közös vacsora végéig, június 1-jén 08.00 órától a program végéig) a Hotel Azúr és a szállodák között folyamatos busztranszfert biztosítunk.

Regisztráció

Részvételi díjak	2013.04.19-ig	2013.04.19-től	Helyszínen
Résztvevő	28.000,- Ft	32.000,- Ft	35.000,- Ft
Szakdolgozó, 30 év alatt, Nyugdíjas	18.000,- Ft	21.000,- Ft	24.000,- Ft
Kísérő	19.000,- Ft	22.000,- Ft	25.000,- Ft
Kiállító	25.000,- Ft	25.000,- Ft	25.000,- Ft

A részvételi díj 27% áfa-t tartalmaz.

A részvételi díj tartalmazza a tanfolyamon való részvételt, a tanfolyam kiadványait, a kiállítás megtekintését, kávészüneteket, ebédeket és a közös vacsorán való részvételt 1 fő részére.

A kísérői részvételi díj tartalmazza a részvételt a tanfolyam közös vacsoráján 1 fő részére és 2 ebédet (a kongresszus tudományos programjai ezzel a belépővel nem látogathatók).

Jelentkezés

Legutolsó jelentkezési határidő: 2013. május 27., az ezután beérkező jelentkezéseket az iroda helyszíni regisztrációként kezeli.

A 2013. május 27. után, illetve a helyszínen jelentkező résztvevőknek a szervező iroda túljelentkezés esetén nem feltétlenül tudja biztosítani a tanfolyam anyagait, illetve a közös vacsorán való részvételt.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a közös vacsorán csak kitűzővel lehet részt venni!

Szálláshelyek

Hotel Azúr****	8600 Siófok, Erkel Ferenc utca 2/C.
Vértés Hotel	8600 Siófok, Batthyány u. 24.
Hotel Yacht Club*** superior	8600 Siófok, Vitorlás u. 14.
CE Plaza Hotel	8600 Siófok, Somogyi Bacsó út 18/b.
Hotel Residence	8600 Siófok, Erkel Ferenc u. 49.
Villa Margarita	8600 Siófok, Sirály utca 4.

- A szobák elfoglalása: 2013. május 31-én, pénteken 14.00 órától, rugalmasan az érkezés sorrendjében történik. Csomagszobát biztosítunk!
- A szobák elhagyása: 2013. június 1-jén, szombaton 10.00 óráig, a Hotel Azúrban 12.00 óráig lehetséges.

Regisztráció és szállásfoglalás lemondási feltételei

- Lemondási határidő: 2013. április 26.
- 2013. április 26. utáni lemondás esetén nem áll módunkban sem a részvételi-, sem a szállásdíj visszatérítése.

Szállás térkép



- A Hotel Azúr**
- V Vértés Hotel**
- Y Hotel Yacht Club**
- C CE Pláza Hotel**
- R Hotel Residence**
- M Villa Margarita**



tekintettel a hölgyekre

LADEEPHARMA

Engem nem lehet elfelejteni...



- 24/4, optimalizált adagolási séma
- Szedési hiba előfordulási gyakorisága kisebb¹
- Magasabb fogamzásgátlási hatékonyság a fiatalok körében is²

1. Dinger J. et al - Effectiveness of Oral Contraceptive Pills in a Large U.S. Cohort Comparing Progestogen and Regimen; Obstetrics & Gynecology Jan. 2011, 117, No. 1
2. Dinger J. - Comparative effectiveness of combined oral contraceptives in adolescents; J Fam Plann Reprod Health Care 2011, 37: 118

Velgyn 3 mg/ 0,02 mg filmtabletta ATC kód: G03A A12. **Hatóanyag:** 3 mg drospirenon és 0,02 mg etinilösztadiol aktív filmtablettánként. **Terápiás javallatok:** Orális fogamzásgátlás. **Adagolás és alkalmazás:** Per os. Napi egy aktív (rózsaszín) tablettát 24 egymást követő napon, majd napi egy inaktív (fehér) tablettát 4 napon át. A tablettaszedés folyamatos. Az első tablettát a menstruáció első napján kell bevenni. A következő csomag szedését az előző csomag utolsó tablettájának bevitelét követő napon kell megkezdeni a naponkénti tablettaszedés megszakítása nélkül, függetlenül attól, hogy a megvonásos vérzés befejeződött-e. **Ellenjavallatok:** aktív vagy a kórelőzményben szereplő vénás thrombosis (mélyvénás thrombosis, tüdőembólia); aktív vagy a kórelőzményben szereplő artériás thrombosis (pl. myocardialis infarctus) vagy thrombosis kialakulására utaló állapotok (pl. angina pectoris, TIA.); aktív vagy a kórelőzményben szereplő cerebrovasculáris esemény; artériás thrombosisra hajlamosító jelentős, vagy többszörös rizikófaktor(ok) (diabetes mellitus vascularis tünetekkel; súlyos magasvérnyomás; súlyos dyslipoproteinémia); örökített vagy örökletesen predisponált vénás vagy artériás thrombosis, valamint APC-rezisztencia, antitrombin-III hiány, protein C hiány, protein S hiány, hiperhomociszteinémia és antifoszfolipid-antitestek (anticardiolipin-antitestek, lupus anticoagulans); aktív vagy a kórelőzményben szereplő súlyos hypertnygnyidaemiával társult pancreatitis; aktív vagy a kórelőzményben szereplő súlyos májbetegség, míg a májfunkció-értékek nem normalizálódnak; súlyos veseelégtelenség vagy akut veseelégtelenség; fennálló, vagy a kórelőzményben szereplő (ő- vagy rosszindulatú) májdaganat; kórimézett vagy feltételezett szexuáliszteroid-dependens malignomák (pl. nem-i szervek, emlő rosszindulatú daganata); tisztázatlan eredetű hüvelyvérzés; lokális neurológiai tünetekkel járó migrén a kórelőzményben. Velgyn 3 milligramm/ 0,02 milligramm filmtablettát hatóanyag(a)ival vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. **Mellékhatások:** érzelmi labilitás; fejfájás; hányinger; emlőfájdalom, metrorrhagia, amenorrhoea. **Csomagolás típusa és kiszerelése:** 24 db aktív (rózsaszín) + 4 db placebo (fehér) filmtablettát. **Csomagolási egységek:** 1 x 28 filmtablettát, 3 x 28 filmtablettát. **Osztályozás:** Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (V). **Forg. hoz. eng. jog.:** LadeePharma Kft., 1036 Budapest, Lajos u. 48-66., Magyarország. **Forg. hoz. eng. szám:** OGYI-T-22325/01 1x28, OGYI-T-22325/02 3x28. Szöveg ell. dátuma: 2012. október 29. **A Velgyn tablettát rendelése előtt, kérjük, olvassa el a részletes alkalmazási előírást!**

Feladhatatlan biztonság. Velgyn


LadeePharma Kft.

1036 Budapest, Lajos u. 48-66. E. ép. I. tel.: 06 1 275 0338, 06 1 275 0343 | fax: 06 1 275 3219 | e-mail: info@ladeepharma.hu

www.ladeepharma.hu

2013.03.12.

Kiállítói alaprajz



- | | | |
|--|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Atmos Hör-Ka Kft. | 14. Maternity Magánklinika | 23. Gyno-Cont Kft. |
| 2. Istenhegyi Családtervezési és Nőgyógyászati Szol. Központ | 15. Sonarmed Kft. | 24. HumanCell MCC Kft. |
| 3. Phytotec Bt. | 16. GlaxoSmithKline Kft. | 25. SG-Medallied Kft. |
| 4. Würwag Pharma Kft. | 17. LadeePharma Kft. | 26. Sanadis Hungária Kft. |
| 5. Karl Storz Endoskop Austria GmbH | 18. Boehringer Ingelheim RCV | 27. Amy Medical Kft. |
| 6. MSD Pharma Hungary Kft. | 19. Richter Gedeon NyRt. | 28. G1 Intézet Kft. |
| 7. Sejtbank Kft. | 20. Sandoz Hungária Kft. | 29. Elektro-Optika Kft. |
| 8. TEVA Magyarország ZRT. | 21. Lux Hungária Kft. | 30. Krio Intézet Kft. |
| 9. Bayer Hungária Kft. | 22. Anamed Kft. | 31. Gyümölcsborokháza.hu Kft. |
| 10. HiPP Kft. | | |
| 11. Merck Kft. | | |
| 11. Merck Serono Képviselet | | |
| 12. Cord-Blood Center SRO MFT | | |
| 13. Q Pharma Kft. | | |

A Cord Blood Center Csoport

✓ SEJTMEGTARTÓ MÓDSZER

A speciális feldolgozási módszerek köszönhetően az értékes őssejt 99%-a¹ rendelkezésünkre áll. Egy jövőben szükségessé váló transzplantáció esetében az őssejt száma a legfontosabb.

✓ VSEL SEJTEK MEGŐRZÉSE


A sejtmegtartó feldolgozási technika lehetővé teszi a legtöbb őssejt tárolását és más fontos sejtek megőrzését, pl. a VSEL sejteket. VSEL sejtek – Very small embryonic like stem cell (nagyon kicsi embrionális szerű őssejt): az őssejtkezh hasonló kis sejtek, amelyek a vörösvérsejtekkel összetapadva találhatók.

✓ TÁMOGATÓI PROGRAMOK

Európában egyedülként a **Transzplantáció Támogatási Program** keretén belül köldökzsinórvér transzplantációs támogatást nyújtunk ügyfeleink részére – összesen 185 000 € értékben. A **Segítőkéz Program** célja, hogy segítségünk azon ügyfeleinknek, akik gyermeke gyermekbénulásban szenved vagy súlyos veleszületett immunzavarokkal vagy vérképzési rendellenességekkel rendelkeznek.

✓ PLACENTÁRIS VÉRVETELI SZOLGÁLTATÁS

A Cord Blood Center a Placentáris vérvétel lehetőségét kínálja ügyfelei számára. Az eljárás során alkalmazott módszerrel **akár 40%-kal nagyobb mennyiségű vér, és így több őssejt levételére van lehetőség.** Minél több őssejt kerül transzplantációra, annál nagyobb a graft megtapadásának esélye és sebessége.² 44 közösségi őssejtbank mintájának összehasonlító vizsgálata alapján a Cord Blood Center csoport által feldolgozott és tárolt minták tartalmaznak a **legnagyobb számú őssejtet egységenként.**³



Forrás: Annual Report BMDW 2010, page 11, table 5

(1) Chow R. et al: Analysis of Hematopoietic Cell Transplants Using Plasma-Depleted Cord Blood Products That Are Not Red Blood Cell Reduced. Biol of Blood and Marrow Transplant. 2007;13 (11):1346-1357. (2) Grewal et al., Blood 2003;101:4233-4244 Unrelated donor hematopoietic cell transplantation: marrow or umbilical cord blood? American Society of Hematology (3) Annual Report BMDW 2010, page 11, table 5

Te
vagy
a legfontosabb!

- Corenelle 3mg/0,02mg filmtabletta 21x
Bruttó fogyasztói ár (javasolt): **1637 Ft**
- Corenelle 3mg/0,02mg filmtabletta 63x (3x21)
Bruttó fogyasztói ár (javasolt): **4330 Ft**
- Corenelle 3mg/0,03mg filmtabletta 21x
Bruttó fogyasztói ár (javasolt): **1774 Ft**
- Corenelle 3mg/0,03mg filmtabletta 63x (3x21)
Bruttó fogyasztói ár (javasolt): **4667 Ft**

Minőségi fogamzásgátlók elérhető áron.

TEVA

CORENELLE
drospirenon/etinilösztadiol

kedvező testsúlyra gyakorolt hatás
4. generációs gesztagén komponens

Corenelle 3 mg/0,03 mg filmtabletta
3 mg drospirenon és 0,03 mg etinilösztadiol filmtablettánként.
Segédanyag: 62 mg laktóz-monohidrát filmtablettánként. ATC: G03AA12

Corenelle 3 mg/0,02 mg filmtabletta
3 mg drospirenon és 0,02 mg etinilösztadiol filmtablettánként.
Segédanyag: 44 mg laktóz-monohidrát filmtablettánként. ATC: G03AA12

Terápiás javallatok: Orális fogamzásgátlás.

Adagolás és alkalmazás: Az adagolás módja: szájon át történő alkalmazás. A tablettákat a buborékosomagolás feltüntetett sorrendben, minden nap körülbelül ugyanabban az időpontban, szükség esetén kevés folyadékkal kell bevenni. 21 egymást követő napon keresztül, naponta 1 tablettát kell bevenni. A következő csomag szedését 7 napos tabletta nélküli időszak után kell elkezdni, melynek során megvonásos vérzés lép fel. A megvonásos vérzés általában az utolsó tablettát bevételel követő 2-3. Napon jelentkezik, és nem feltétlenül fejeződik be a következő csomag szedésének kezdetéig.

Hogyan kell elkezdni a Corenelle szedését?
Ha korábban (az előző hónapban) nem alkalmaztak hormonális fogamzásgátlást: A tablettát szedését a természetes női ciklus első napján (azaz a havi vérzés első napján) kell elkezdni. Más kombinált orális fogamzásgátlókról történő áttérés esetén a Corenelle szedését az előzőleg alkalmazott COC szokásos hormonmentes időszakát követő napon kell elkezdni. Hüvelygyűrű vagy transzdermális tapasz használata esetén a Corenelle szedését lehetőleg az eszköz eltávolításának napján kell elkezdni, legkésőbb akkor, amikor az eszköz következő alkalmazása esedékessé válna. Csak progesztogént tartalmazó készítményről vagy progesztogént tartalmazó intrauterin rendszer (IUS)

alkalmazásáról történő áttérés esetén bármelyik napon át lehet térni a csak progesztogént tartalmazó tablettát szedéséről (implantátum vagy IUS alkalmazásáról) az eszköz eltávolításának napján, injekciós készítmény használatáról a következő injekció esedékességének napján), azonban ezekben az esetekben tanácsos a tablettaszedés első 7 napján kiegészítő barrier-elvű fogamzásgátló módszert is alkalmazni. Az első trimeszterben végzett terhességmegszakítás után a tablettát szedése azonnal elkezdhető. Szülés vagy a második trimeszterben végzett terhességmegszakítás után a gyógyszer szedését a szülést vagy a második trimeszterben végzett terhességmegszakítást követő 21-28. napon kell elkezdni. Későbbi kezdés esetén, az első 7 nap során kiegészítő barrier-elvű fogamzásgátló módszert is alkalmazni kell. Ha azonban ezt megelőzően már sor került nem kívánatos, a COC alkalmazásának tényleges megkezdése előtt ki kell zárni a terhesség lehetőségét, vagy várni kell az első havi vérzésig.

Ellenjavallatok: Az alábbiakban felsorolt betegségekben és állapotokban nem szabad kombinált orális fogamzásgátlókat (COG) szedni. Amennyiben a COC alkalmazásának ideje alatt jelentkeznek valamelyik a felsorolt betegségek közül, azonnal abba kell hagyni a készítmény szedését. Fennálló vagy a körülményben szereplő vénás thrombosis (mélyvénás thrombosis, tüdőembólia); artériás thrombosis (pl. myocardialis infarktus) vagy ennek kialakulására utaló állapotok (pl. angina pectoris, átmeneti ischaemias roham); cerebrovasculáris esemény; artériás thrombosis súlyos vagy többszörös rizikófaktorainak jelenléte; diabetes mellitus vasculáris tünetekkel; súlyos hipertónia; súlyos dyslipoproteinémia; örökített vagy szerzett hajlam vénás vagy artériás thrombosisra, például APC-rezisztencia, antitrombin-III hiány, protein-C hiány, protein-S hiány,

hyperhomocysteinémia és antifoszfolipid-antitestek (antikardiolipin-antitestek, lupus antikoaguláns); fennálló vagy a körülményben szereplő pancreatitis, ha súlyos hypertriglyceridémiaival társul; súlyos májbetegség, amíg a máj-funkció-értékek nem normalizálódnak; súlyos veseelégtelenség vagy akut veseelégtelenség; (fő- vagy rosszindulatú) májdaganat; ismert vagy feltehető, szexuálsteroid-dependens rosszindulatú daganatok (pl. nemi szervek vagy emlő rosszindulatú daganatai); tisztázatlan eredetű hüvelyi vérzés; lokális neurológiai tünetekkel járó migrén a körülményben; a Corenelle filmtablettát hatóanyagával vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. **Termékenység, terhesség és szoptatás:** A Corenelle alkalmazása a terhesség ideje alatt ellenjavallt. A szoptatást befolyásolhatja a COC szerek, mivel csökkenthetik az anyatej mennyiségét és megváltoztathatják az összetételét. Ezért a COC szerek alkalmazása általában nem javasolt addig, ameddig a szoptató anya nem választja el teljesen a gyermekét. A Corenelle filmtablettát hatóanyagával vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység.

Nemkívánatos hatások, mellékhatások: Gyakori: menstruációs zavarok, mensturációs ciklusok közötti vérzés, emlőfájdalom, fejfájás, depresszív hangulat, migrén, hányinger, leukorrhoea, hüvelyi monília.

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: TEVA Magyarország Zrt. 2100 Gödöllő Repülőtér út 5. **A forgalomba hozatali engedély első kiadásának/megújításának dátuma:** 2010. október 25. **A szöveg ellenőrzésének dátuma:** 2012. december 20.

A dokumentum lezárásának dátuma: 2013. február

Forrás: 1. Foidart JM et al. Contraception 2006; 73: R30-340.