


MAGYAR SZEXUÁLIS MEDICINA TÁRSASÁG
V. TUDOMÁNYOS ÜLÉSE

PROGRAMFÜZET



Visegrád

2018. június 8-10.

HÓLYAGHURUT KEZELÉSE ÉS MEGELŐZÉSE TERMÉSZETES EREDETŰ HATÓANYAGOKKAL

Kezelés



**Enyhe hólyaghurut
korai tüneteinek kezelésére**

Medveszőlőlevél-kivonatot tartalmazó,
vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer

Megelőzés



**Visszatérő hólyaghurut
kezelésére és az akut epizód
kiegészítő kezelésére**

Csak vényre kapható gyógyszer

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!

Urzinol bevonat tabletta 30x

(OGYI-TN 15/01) OGYÉI által jóváhagyott alkalmazási előírása az alábbi linken olvasható:
https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/index.php?action=show_details&item=34279
Utolsó megtekintés: 2018. április 2.

Uro-Vaxom kemény kapszula 30x

(OGYI-T-9748/01) OGYÉI által jóváhagyott alkalmazási előírása az alábbi linken olvasható:
https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/index.php?action=show_details&item=22833
Utolsó megtekintés: 2018. április 2.

Kezelés kiegészítése



Vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz

**Bakteriális vaginózis és visszatérő hólyaghurut
kezelésének és megelőzésének kiegészítésére,
különösen a húgyúti fertőzések kiújulásakor és
antibiotikum-kezelést követően, akár a terhesség
és szoptatás ideje alatt is**

Bővebb információért olvassa el a készítmény használati útmutatóját! www.vitagyn.hu

Tisztelt Kollégák!

A MSZMT társaság ötödször rendezi meg nagysikerű multidiszciplinális konferenciáját, melyen valamennyi szexuális gyógyításban érintett terület képviselve lesz. Lehetőség adódik a sikeres gyógyításhoz szükséges legújabb ismeretek megszerzésére, a vitás kérdések megtárgyalására.

Szakmai konszenzust szeretnénk elérni a **szexuális zaklatást** illetően, illetve együttműködés koordinálását javítani a **transzszexuálisok kezelésében**.

A tudományos ülést az **Európai Szexuális Medicina Társaság /ESSM/** hivatalos helyi programjaként fogadja el és nemzetközileg ismert előadók küldésével támogatja.

A szexuál-endokrinológia egyik legaktívabb tehetsége, **Giovanni Corona** is ellátogat hozzánk. A külföldi előadók mellett a **legismertebb hazai szakemberekkel** való eszmecsere nyílik majd lehetőség.

Mindenkit várunk szeretettel!



Dr. Fekete Ferenc
az MSZMT elnöke

A rendezvény szervezőbizottsága:

Prof. Dr. Ács Nándor

Dr. Hevesi Krisztina

Dr. Pilling János,

Prof. Dr. Bajory Zoltán

Dr. Kopa Zsolt

Prof. Dr. Rurik Imre

Dr. Fekete Ferenc

Dr. Molnár Károly

Prof. Dr. Wikonkál Norbert

Dr. Gyovai Gabriella

Prof. Dr. Nyirády Péter

Tudományos szervező:

Dr. Fekete Ferenc és Prof. Dr. Nyirády Péter

A Magyar Szexuális Medicina Társaság vezetőségi tagjai

Telefon: +36 1 213 7737

E-mail: sexualmedicina@gmail.com

Szervező iroda:

Huba Stefánia

Congressline Kft.

1065 Budapest Révay köz 2.

Telefon: +36 1 429 0146, +36 1 312 1582

Fax: +36 1 429 0147

Email: huba@congressline.hu



congressline

sexualmedicine.hu/rendezvenyeink.html



Szponzorok és kiállítók



BERLIN-CHEMIE
MENARINI

Innovációval az életminőség javításáért.

PHYTOTEC
VALÓDI GYÓGYSZER A TERMÉSZETTŐL



 **Reprosyst**®



HUMANCELL
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK
ÖSSZEJTBANK

 **KRKA**



RICHTER GEDEON



STRATHMANN KG

urell®
a húgyutak egészségéért


medimprove



Goodwill
PHARMA





SEGÍTÜNK SZÜLŐVÉ VÁLNI!



Termékenységési problémák
teljes körű kivizsgálása
és kezelése



+36 (1) 613 6293



info@reprosyst.hu



1044 Budapest, Megyeri út 53.

www.reprosyst.hu

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Tudományos ülés helyszíne:

Thermál Hotel Visegrád - 2025 Visegrád, Lepence völgy 2.

Résztvételi díjak

Típus	2018. április 15-ig	2018. április 15. után
Résztvételi díj	33.000 Ft	40.000 Ft
Résztvételi díj MSZMT tagoknak	30.000 Ft	35.000 Ft
Résztvételi díj pszichológusoknak és rezidenseknek	15.000 Ft	18.000 Ft
Kiállító	10.000 Ft	15.000 Ft
Kísérő	15.000 Ft	20.000 Ft

A résztvételi díjak 27% Áfa-t 6.900 Ft/nap közvetített étkezést tartalmaznak.

A résztvételi díjak tartalmazzák a konferencia anyagokat, kávészüneteket, a szombati ebédet, de **NEM tartalmazzák** a pénteki ebéd és péntek esti vacsora költségét.

A kíséri résztvételi díj a szombati ebédet és a péntek esti vacsorát is tartalmazza, azonban **NEM tartalmazza a pénteki ebédet**. Kísérő a tudományos programokat és a kiállítást nem látogathatja.

Szállás

Hotel	Szoba 1 fő részére	Szoba 2 fő részére
Thermál Hotel Visegrád**** 2025 Visegrád, Lepence völgy 2.	28.600 Ft	38.500 Ft

A fenti árak szoba/éjszaka értendők, tartalmazzák a reggelit és az adókat (ÁFA,IFA).

A dunai panorámás szoba felára 1800 Ft/ szoba / éj.



Fakultatív programok

Ebéd (2018. június 8. péntek)	5.900 Ft
Közös vacsora (2018. június 8. péntek)	9.000 Ft
Ebéd (2018. június 9. szombat) A részvételi díj tartalmazza.	

Kiállítás

A tudományos program teljes ideje alatt gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz gyártó cégek kiállítása tekinthető meg.

Közös vacsora

2018. június 8., péntek (9000 Ft/fő), Thermál Hotel Visegrád

Felhívjuk figyelmüket, hogy a részvételi díjak a vacsora költségét nem tartalmazzák, csak a kísérők esetében.

Előadások

Az egyes előadások időtartamát a programban jelöltük. Kérjük az előadókat az előadások idejének pontos betartására.

Az előadások feltöltésére az adott előadásblokk előtti szünetben vagy korábbi szünetekben van lehetőség.

Szak- és továbbképzés

A rendezvény akkreditálásra került, a teljes programon való részvétel esetén 18 pont kerül jóváírásra.

Regisztrációs iroda nyitvatartása

2018. június 8. péntek 12.00-18.00

2018. június 9. szombat 8.00-18.00

Lemondási feltételek

Lemondási határidő: 2018. április 27.

2018. április 27. előtt a részvételi díj 50% át és a szállás egészét visszafizetjük.

2018. április 27. után nem áll módunkban részvételi díjat és a szálláseleget visszatéríteni.





H U M A N C E L L

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK

Ö S S E J T B A N K

Össejtben a jövő!



Elérhetőségeink: ☎ +36 (30) 660 0472

✉ info@humancell.hu

www.humancell.hu

PROGRAM

2018. június 8. péntek

14.00-14.30 Megnyitó, köszöntés

Dr. Buzogány István, Dr. Fekete Ferenc, Dr. Gyovai Gabriella,
Dr. Kopa Zsolt, Dr. Molnár Károly, Prof. Dr. Nyirády Péter,
Prof. Dr. Papp György, Prof. Dr. Rurik Imre

14.30-16.00 AGING MALE - AGING FEMALE

Üléselnök: Dr. Buzogány István, Dr. Gyovai Gabriella, Prof. Dr. Papp György,
Dr. Ladoniczky Zoltán

Az emberiség változó szexualitása, különös tekintettel az öregkorra
(30 perc)

Prof. Dr. Papp György

MH Egészségügyi Központ, Urológia-andrológiai Osztály, Budapest

Szexualitás időskorban (20 perc)

Prof. Dr. Rurik Imre

*Debreceni Egyetem, NK Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék,
Debrecen*

Forró hullámok örvényében. Esetismertetés a változókor lelki nehézségeiről (15 perc)

Dr. Süli Ágota

Pasarét Pszichoterápiás Rendelő, Budapest

Újdonságok a változókor hormon terápiában (15 perc)

Dr. Gyovai Gabriella

Nőgyógyászati magánrendelés, Szentes

Megbeszélés (10 perc)

16.00-16.30 PHYTOTEC SZIMPÓZIUM

A visszatérő hólyaghurut hatása a szexuális életre

Prof. Dr. Tenke Péter

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, Urológiai Osztály, Budapest

16.30-17.00 Kávészünet



17.00-18.00 TRANSZSZEKUALISOK KEZELÉSE – KERKASZTAL MEGBESZÉLÉS
Üléselnök: Prof. Dr. Bajory Zoltán, Prof. Dr. Nyirády Péter, Dr. Vizi János,
Dr. Simon Lajos

A transzszekualisok kezelésének aktuális helyzete (15 perc)

Prof. Dr. Nyirády Péter

Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest

Transzneműek a pszichiáter szemszögéből (20 perc)

Dr. Simon Lajos

Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai Klinika, Budapest

Endokrinológiai teendők transzszekualisoknál (15 perc)

Dr. Szűcs Nikolette

Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest

Megbeszélés (10 perc)

18.00-19.00 A PDE5 GÁTLÓ VÁLASZTÁS SZEMPONTJAI
Berlin Chemie/A. Menarini Kft. által támogatott szimpózium

What have we learned after 20 years of PDE5i (30 perc)

Giovanni Corona MD., Ph.D.

University of Florence, Florence, Italy

Az Avanafil helye a merevedési zavar kezelésében (20 perc)

Dr. Fekete Ferenc

Mr Clinic magánrendelés, Budapest

Megbeszélés (10 perc)

19.00-19.30 „IGEN a nemek közt” -hasonlóságok és eltérések a nők és férfiak között
(30 perc)

Dr. Piczkó Katalin

Tolerance-Training Kft, Budapest

20.00- Közös vacsora



POLLSTIMOL®-CERNIL

A PROSZTATAGYULLADÁS TERÁPIÁJÁRA

1a evidenciaszint a CPPS kezelésében*



*forrás: EAU Guidelines of Chronic Pelvic Pain, 2014



- GYULLADÁSCSÖKKENTŐ
- CSILLAPÍTJA
A PROSZTATAGYULLADÁS TÜNETEIT
- KÖNNYÍTI A VIZELETÜRÍTÉST

Vény nélkül kapható gyógyszer, keresse a patikákban! **Javallatok:** krónikus, nem bakteriális eredetű prostatitis, prostatovesiculitis, urethritis. Benignus prostata hyperplasia esetén fellépő vizeletürítési zavarok. **Adagolás:** a kezelés első hetében napi 3x2 tabletta, a második héttől kezdve naponta 2x2 tablettát étkezés után, kevés vízzel bevenni. A panaszok átmeneti erősödésénél az adag 3x2 tablettára emelhető. **Az információ lezárása:** 2018. január 2. **Szakmai információ:** Strathmann KG Képviselő, **Telefon:** (1) 320-2865, email: info@strathmann.hu



STRATHMANN

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT,
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT.

2018. június 9. szombat

9.00-10.00 GENITÁLIS SEBÉSZET

Üléselnök: Prof. Dr. Bajory Zoltán, Prof. Dr. Nyírády Péter, Dr. Flaskó Tibor,
Dr. Török Alexander

Hímvesződaganat miatt végzett funkciómegőrző műtétek (15 perc)

Dr. Murányi Mihály

Debreceni Egyetem, Urológiai Klinika, Debrecen

Pénisz protézis implantáció szövődményei és kezelésük (20 perc)

Dr. Török Alexander

Erector Clinic Uro-szexológiai Centrum, Pécs

Metoidioplastika - első transzszexuális esetünk (15 perc)

Dr. Király István

Szegedi Tudományegyetem, Urológiai Klinika, Szeged

Megbeszélés (10 perc)

10.00-11.00 ESZTÉTIKA, DERMATOLÓGIA ÉS SZEXUALITÁS

Üléselnök: Dr. Erős Erika, Prof. Dr. Nyírády Péter

Mi újság az esztétikai kezeléseken terén- hogyan legyek szexi? (20 perc)

Dr. Papp Ildikó

Körúti Orvosesztétikai Centrum, Budapest

Intimszépség – az orvos szerepe és felelőssége (15 perc)

Dr. Erős Erika

Egészség és Jólét Klinika, Budapest

Lichen Sclerosus kezelése napjainkban (15 perc)

Dr. Bánvölgyi András

Semmelweis Egyetem, Bőr-,Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika, Budapest

Megbeszélés (10 perc)

11.00-11.30 Kávészünet

11.30-12.00 Mit tehetünk a kiégés szindróma ellen? - Interaktív előadás

Dr. Jónás Zoltán

Abaculus Kft, Budapest



12.00-12.30 MSZMT Közgyűlés

12.30-14.00 Ebédszünet

14.00-15.30 SZEXUÁLIS ZAKLATÁS, ABÚZUS

Üléselnök: Dr. Hevesi Krisztina, Dr. Pilling János

A szexuális zaklatás pszichológiai és társadalmi hátteréről (30 perc)

Sz. Mikus Edit

Szexológiai és integrálpszichológiai rendelés, Kecskemét

„Szexualitás másképp?” Párkapcsolati konfliktusok és (meg)oldásaik (20 perc)

Hal Melinda

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Pszichológiai Intézet, Budapest

“Vetkőzzön le, kérem!” Intim kapcsolat orvos és páciens között (30 perc)

Dr. Pilling János

Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Budapest

Megbeszélés (10 perc)

15.30-18.00 SZEXUALITÁS NAPJAINKBAN

Üléselnök: Dr. Gyovai Gabriella, Dr. Hevesi Krisztina, Dr. Molnár Károly

Szexuális zavarok a periconceptionalis és postnatalis időszakban (20 perc)

Dr. Erős Erika

Egészség és Jólét Klinika, Budapest

Gyermekigény, mint a szexuális zavarok forrása? (20 perc)

Dr. Kopa Zsolt

Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest

Figyelemzavar, kapcsolat, szex (20 perc)

Dr. Gyovai Gabriella

Nőgyógyászati magánrendelés, Szentes

21. századi szexuális viselkedés (20 perc)

Csonka Balázs

Pszichológus, Budapest



A kőrisbogártól a Viagráig (fejezetek a szexualitás történetéből)

(20 perc)

Dr. Varga Attila

Debreceni Egyetem, Urológiai Klinika, Debrecen

Szexualitás a robottechnika korszakában (20 perc)

Dr. Hevesi Krisztina

ELTE PPK Személyiség és Egészségpszichológiai Tanszék, Budapest

Megbeszélés (10 perc)

19.00- Esti program – kapcsolatépítő találkozó

2018. június 10. vasárnap

7.30-8.00 Közös futás-nordic walking a Gyula forráshoz

**9.00-11.00 A SZEXUÁLIS MEDICINA MINT MULTIDISZCIPLINÁLIS
TERÜLET- JELEN ÉS JÖVŐ**

Kerekasztal megbeszélés

Prof. Dr. Bajory Zoltán, Dr. Fekete Ferenc, Dr. Gyovai Gabriella,

Dr. Kopa Zsolt, Prof. Dr. Nyirády Péter, Dr. Pilling János

11.00-11.15 Zárás



TADILECTO®

20 mg filmtabletta

tadalafil

Generikus **tadalafil**
készítmény

Több menetre készzen.

ÚJ!



Tadilecto 20 mg filmtabletta. 20 mg tadalafil tartalmaz filmtablettánként. Lakóköz tartalmaz: **Terápiás jav:** Erectilis dysfunctio kezelés férfiaknál. Azaz, hogy a tadalafil hatásos legyen, szexuális stimuláció szükséges. A Tadilecto nőknél történő alkalmazása nem javasolt. **Adagolás és alkalmazás:** Férfiak: férfiak. A javasolt adag általában 10 mg, amit a várható szexuális aktus megelőzően kell bevenni. Étkezés közben, vagy étel/függel nélkül. Azonként a betegnek, akinek 10 mg tadalafil nem és el nem megfelelő hatás, megpróbálható a 20 mg-os adag alkalmazása. Ezt a szexuális aktus előtt legalább 30 perccel lehet bevenni. A hatékonyság legfeljebb naponta egyszer alkalmazható. A 10 és 20 mg-os tadalafil a várható szexuális aktus előtt kell bevenni, folyamatosan, napi használatra nem javasolt. Azonként a betegnek, akinek a tadalafil előre láthatóan gyakran (azaz legalább hetente kétszer) fogad alkalmazni – a beteg világszerte és az orvos megelégedése alapján – megfontolható a tadalafil legalacsonyabb dózisának napi egyszeri adagolására. Ezért a betegnek a javasolt adag naponta egyszer 5 mg, amit megelőzően ugyanabban a napszakban kell bevenni. Az egyéni toleranciától függően az adag naponta egyszer 2,5 mg-ra csökkenthető. A mindennapos folyamatos alkalmazás hatékonyságát időszakosan újra kell értékelni. Szűves vesekárosodásban szenvedő betegnek, a maximális ajánlott adag 10 mg. A napi egyszeri tadalafil alkalmazás adagolási rend nem javasolt a súlyos vesekárosodásban szenvedő betegnek. Károsodott májfunkcióval férfiak: A tadalafil erektilis dysfunctio kezelésére javasolt adagja szűkes szerinti alkalmazásban 10 mg, amit a várható szexuális aktus megelőzően, étkezés közben vagy étel/függel nélkül kell bevenni. Szűves májkárosodásban (Child-Pugh C stádium) szenvedő betegekkel kapcsolatban korlátozottan állnak rendelkezésre klinikai adatok a tadalafil biztonságosságára vonatkozóan, ezért ha a készítményt felírják, a gyógyszeres rendelés orvosának egyenként kell gondoskodni mérlegelnie az előny/hasznát, az arányt. Májkárosodásban szenvedő betegek esetében a 10 mg-os megadott tadalafil dózist alkalmazásról nincsenek hozzáférhető adatok. Májkárosodásban szenvedő betegnek nem vizsgálják a napi egyszeri tadalafil adagolási rendet, ezért ha a készítményt mégis felírják, a gyógyszert rendelés orvosának egyenként kell gondoskodni mérlegelnie az előny/hasznát, az arányt. Gyermek és serdülő: Erectilis dysfunctio kezelésben a Tadilecto-nak gyermekek esetében nincs releváns alkalmazása. A Tadilecto szájban és alkalmazandó 2,5 mg, 5 mg, 10 mg és 20 mg-os filmtabletták formájában kapható. **Ellenjavallatok:** A készítmény használatával vagy bármely segédanyagjal szembeni túlérzékenységgel. Klinikai vizsgálatokban a tadalafil fokozta a nitrogén vényomáscsökkentő hatását. Ez valószínűleg a nitrogén és a tadalafil nitrogén-oxid (NO) anyagcsereciklusra gyakorolt közös határának a következménye. Ezért a tadalafil alkalmazása ellenjavallt azonként a betegnek, akinek bármilyen organikus nitrogén csökkenése. Tilos tadalafil bevenni azonként a szívbetegekben szenvedő férfiaknak, akinek a szexuális tevékenység végzése nem tanácsos. Előzetesen fennálló cardiovascularis betegség esetén a kezelőorvosnak mérlegelnie kell a szexuális aktivitás potenciális kardialis kockázatát. A klinikai vizsgálatokban nem vettek részt a következő cardiovascularis betegségekre szenvedők csoportját, így ezeket szexuális a tadalafil használatra ellenjavallt.

- betegek, akik 30 napon belül myocardialis infarktust estek át.
- betegek, akiknél instabil angina vagy angina pectorisra a szexuális aktus alatt.
- betegek, akiknél szívkiválasztás a megelőző 6 hónap alatt a New York Heart Association szerinti 2-es vagy ennél súlyosabb fokozott volt.
- betegek, akiknél szívkiválasztás aritmiája, hipotónia (<90/50 Hgmm) vagy kezeletlen hipertonია volt megállapítva.
- azok a betegek, akiknél 6 hónapon belül stroke zajlott le.

A tadalafil ellenjavallt azon betegek számára, akiknek (előző) látásvizsgálata nem-arteriális anterior ischaemia opticus neuropathia (NAION) előzete. Figyelem! Azért, hogy ez az eredmény összefüggésben volt-e korábbi PDE-5-gátló expozícióval vagy sem. PDE-5-gátló - beleértve a tadalafil is - és garat-ciklus stimulátorok pl. ritmikai együttes alkalmazása ellenjavallt, mivel ez tünetekkel járó hypotóniához vezet. 4 óráig tilos fennálló folyamatos erekció esetén a betegnek szűves orvosi ellátásra van szüksége. Amennyiben a priapizmus nem kezelhető azonnal, a penis szövetek károsodhat, és tartós potenciálcsökkenést okozhat ki. A tadalafil csak helyi koncentrációval alkalmazható azonként a betegnek, akinek a penis anatómiai deformációja (pl. a corpus cavernosum angulatio, fibrosis vagy Peyronie-betegség) vagy priapizmusra hajlamosító betegség (sűrűsítés anómia, myeloma multiplex vagy leukæmia) áll fenn. A tadalafil elhanyagolható mértékben befolyásolja a gátlószerekkel és a gátló kezelésekkel szükséges dózissal. **Mellékhatások:** Leggyakrabban jelentett mellékhatás a fejfájás, dyspepsia, hátfájás és nyálgyulladás, amely mellékhatások gyakorisága a tadalafil emelkedő adagjával együtt nőtt. A jelentett mellékhatások ártalmatlanok, és általában enyhén vagy közepesen súlyos lefolyásúak voltak. A tadalafil napi egyszeri adagokhoz jelentett fejfájások többsége a kezelés elkezdésekor, az első 10-30 napon belül észlelhető. Gyakori volt még a kópiás, orrdugulás, vizsgálatok. **Megjegyzés:** 6 foglalkozás. Készítési orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (V). **Forg. eng. tal:** KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarjenska cesta 6, 8501 Novo mesto, Szlovénia. **Alk. év:** 2017.06.11.

Tadilecto 20 mg filmtabletta 4x ajánlott fogyasztói ára 10 990 Ft

Tadilecto 20 mg filmtabletta 8x ajánlott fogyasztói ára 16 499 Ft

Tadilecto 20 mg filmtabletta 12x ajánlott fogyasztói ára 22 990 Ft

Stabilitás készítmény. A nem támogatott gyógyszerek 2010. január elsejétől szabaddáadás, az árkiegészítés a nagykereskedő és a gyógyszerértékesítő fűg.

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer teljes alkalmazási előírását vagy forduljon a gyártó magyarországi képviselőéhez: Krka Magyarország Kereskedelmi Kft., 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., 3. emelet. Tel.: (+36) 950 8490; Fax: (+36) 214 9520.



Fejlesztés és tudás a kiváló
minőségű, hatásos és
biztonságos termékekért.

Spedra®

avanafil

2. generációs PDE-5 gátló^{1,2}

HATÁSSÁG 12
TOLERÁBILOSSÁG 34
A HATÁS KIALAKULÁSA 25.2
IDŐTARTAM 28

I CAN GET MY
SATISFACTION^{1,6}
ÁLLJ KÉSZEN AZ AKCIÓRA^{2,5**}

A Spedra® erektilis dysfunctio kezelésére javallt felnőtt férfiaknak.
A Spedra® hatásának eléréséhez szexuális stimuláció szükséges.²



Spedra 50 mg, 100 mg és 200 mg tabletta rövidített alkalmazási előírás

Összetétel: 50 mg, 100 mg illetve 200 mg avanafil tablettaként. **Javallatok:** Erektilis dysfunctio kezelése felnőtt férfiaknál. **Adagolás:** A javasolt adag 100 mg, melyet szükség szerint, a szexuális tevékenység előtt hozzávetőleg 15-30 perccel kell bevenni. Az egyéni hatásság és tolerálhatóság alapján az adag legfeljebb 200 mg-ra növelhető vagy 50 mg-ra csökkenthető. A maximális javasolt adagolás gyakoriság: naponta egyszer. A terápis válaszához szexuális stimuláció szükséges. **Ellenjavallatok:** A kisütémi határyagával vagy bármely segédanyagával szerberi toleránság. Szerves nitrát vagy nitrogén-oxid donorok (mint az amid nitrát) bármely formájú szedő betegek. Az 5-ös típusú foszforészteráz (PDE5) gátlók, így az avanafil együtadása guanilát-cikláz stimulátorokkal, például nooquálal ellenjavallt, mivel potenciálisan tüneti hypotónus epizódok kialakulásához vezethet. Előzetesen fennálló cardiovascularis betegség esetén a Spedra felírása előtt a kezelőorvosnak mérlegelnie kell a szexuális aktivitás potenciális kardiális kockázatát. **Az avanafil alkalmazása ellenjavallt:** olyan betegeknek, akik az elmúlt 6 hónapban myocardialis infarctusban, stroke-ban vagy életveszélyes arhythmiaiban szenvedtek; nyugalmi hypotóniában (vérnyomás < 90/50 Hgmm) vagy hypertóniában (vérnyomás > 170/100 Hgmm) szenvedő betegeknek; instabil anginában, szexuális tevékenységre jelentkező anginában vagy a New York Heart Association szerinti 2. vagy annál magasabb stádiumba sorolt pangásos szív elégtelenségben szenvedő betegeknek. Szűlyos máj- és vesebetegségekben (Child-Pugh C osztály) szenvedő betegek. Szűlyos vesebetegségben (GFR ml/perc értéknél alacsonyabb kreatin-clearance) szenvedő betegek. Olyan betegek, akiknek a feloldási látszóvesztését nem arteriális eredetű előző ischaemias opticus neuropathia (NAION) okozta, függetlenül attól, hogy ez az epizód összefüggésben volt-e 5-ös típusú foszforészteráz (PDE5) gátló korábbi szedésével. A retina ismert örökletes degeneratív betegségeiben szenvedő betegek. Erős CYP3A4-gátlókat (közülük a ketokonazol, itraconazol, azitromicin, klaritromicin, indinavir, itraconazol, nefazodon, neflavin, szalvazin, telitromicin) alkalmazó betegek. **Leggyakoribb mellékhatások (≥ 0.1%):** fejfájás, kipirodás, orrdugulás, szédülés, aluszékonyság, sinus eredetű fejfájás, homályos látás, palpáció, hőhullám, sinus pangás, terhelténi dyspnoe, dyspnoe, hányinger, hányás, gyomortáji diszkomfort, hűlfájás, izomrengés, fáradtság, emelkedett májenzimszintek, rendellenes elektrokardiogram, emelkedett szívfrekvencia. **Kiadhatóság:** Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (V). EU/1/13/841/001-003 **Alkalmazási előírás dátuma:** 2017.03. Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását! Artimogatórásban nem részesülnek. **A dokumentum lezárásának időpontja:** 2018.02.06. **Érvényesség dátuma:** 2020.02.06. ^{**} Szükség szerint alkalmazás. A Spedra® hatásának eléréséhez szexuális stimuláció szükséges.

▼ Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészséggel kapcsolatos kockázatokat, amelyekről a gyógyszer használatával kapcsolatban bármilyen feltételezett mellékhatás.

A javasolt adag 100 mg, melyet szükség szerint, a szexuális tevékenység előtt körülbelül 15-30 perccel kell bevenni.²

Hivatkozások:

1. Goldstein I et al. J Sex Med. 2012;9(4):822-33
2. Spedra®. Alkalmazási előírás. 2016. március
3. Corona G et al. Expert Opin Drug Saf. 2016;15(2):237-47
4. Wang H et al. Curr Med Res Opin. 2014;30(8):1565-71
5. Hellstrom WJ et al. J Urol. 2015;194(2):485-92
6. Limin M et al. Expert Opin Investig Drugs. 2010;19(10):1427-37
7. Kedia GT et al. Ther Adv Urol. 2013;5(3):35-41
8. Belkoff LH et al. Int J Clin Pract. 2013;67(6):333-41
9. Katz EG et al. Ther Clin Risk Mngm. 2014; 10: 701-711

****** A hatás kialakulásig eltelt idő vizsgáló tanulmányban az avanafil statisztikailag szignifikáns javulást mutatott a placebohoz viszonyítva az elsődleges hatásossági változó tekintetében kb. 15 perccel a beadást követően.¹

BERLIN-CHEMIE 2040 Budaörs, Neumann J. u. 1.
MENARINI Telefon: +36 23 501 301